

Fülcsepp
Antibiotikum nélkül

OTIPAX®

fenazon, lidokain-hidroklorid



Otipax és a fülfájdalom csökken



**4 csepp
napi 2-3 alkalommal**



Betegei számára: www.otipax.hu

Vény nélkül kapható gyógyszer.
Kizárólag külsőleg használható!

Otipax fülcsepp (OGYI-T-6180/01) A készítmény hatóanyaga 100 g fülcseppben: Fenazon: 4,00 g Lidokain-hidroklorid: 1,00 g **Fülcsepp:** Tiszta, színtelen ill. nagyon halvány sárga színű, alkoholos szagú oldat. **Terápiás javallatok:** A középfül bizonyos, ép dobhártya melletti, fájdalommal járó kórképek helyi tüneti kezelése: pangásos akut középfülgyulladás, ún. hólyagos vírusos otitis, barotraumas otitis. **Adagolás és alkalmazás:** Fülbe alkalmazandó. A hideg oldat a fülben kellemetlen érzést kelthet, ennek elkerülése érdekében használat előtt a tartályt kézzel melegítsük fel. Cseppentő üveg: a fájó fül hallójáratába cseppentsünk naponta 2-3-szor 4 cseppet a cseppentő rugalmas részének óvatos megnyomásával. **Ellenjavallatok:** Ezt a gyógyszert sohasem szabad alkalmazni az alábbi esetekben: fertőzőes vagy sérüléssel eredetű dobhártya perforáció (lásd a Figyelmeztetéseknek), bármelyik összetevővel, különösen lidokainnal szembeni túlérzékenység. **Különleges figyelmeztetések és alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** **Figyelmeztetések:** Óvintézkedésként minden alkalmazás előtt győződjünk meg arról, hogy a dobhártya ép-e. Ha a dobhártya sérült, akkor a hallójáratba cseppentés révén a gyógyszer érintkezésbe kerülhet a középfül képleteivel, és nemkívánatos hatásokat fejthet ki azokra. **Óvintézkedések:** A kezelés időtartama nem lehet hosszabb 10 napnál. Ezt követően a kezelést felül kell vizsgálni. **Gyógyszer kölcsönhatások és egyéb interakciók nem ismertek.** **Terhesség és szoptatás:** Dobhártyasérülés nélkül a szisztémás penetráció valószínűtlen. Következésképpen ez a gyógyszer normál alkalmazási körülmények között szükség esetén alkalmazható terhesség során és szoptató anyáknál. **A készítménynek nincs hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre.** **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Előfordulhatnak helyi reakciók allergia, a hallójárat irritációja vagy vérbősége formájában. **Túladagolás nem értelmezhető.**

Farmakodinámiai tulajdonságok: ATC: S02D A20

HELYI FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ/GYULLADÁSGÁTLÓ FÜLÉSZETI ALKALMAZÁSRA

(S: érzékszervek). Fenazon: fájdalomcsillapító és gyulladásgátló hatásokkal rendelkező pirazon-származék. Lidokain: az amidok csoportjába tartozó helyi érzéstelenítő. **Farmakokinetikai tulajdonságok:** Az alkalmazási mód (külsőleg) és az alkalmazott kis adagok fényében szisztémás felszívódás nem várható (amennyiben a dobhártya ép), ezért farmakokinetikai vizsgálatok végzésének szükségessége nem merült fel. **A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésre.** **Segédanyagok:** Nátrium-bioszulfát, tisztított víz, alkohol, glicerin. **Inkompatibilitások nincsenek.** **Felhasználhatósági időtartam, tárolás és csomagolás:** 3 év. Az első felbontás után: 3 hónap. **Legfeljebb 25°C-on tárolandó.** 16 g oldat fehér, garanciazáras LDPE kupakkal lezárt barna színű üvegbe töltve. Üvegre csavarható, LDPE kupakkal lezárt PE/vinilacetát cseppentő, PE/papír buborékcsoomagolásban. 1 db üveg (16 g) és 1 cseppentő dobozban. **A készítmény felhasználásra/kezelésére vonatkozó útmutatások:** Csavarjuk le az üveg kupakját. Csavarjuk rá a cseppentőt az üvegre. Vegyük le a cseppentő kupakját. Fordítsuk fejjel lefelé az üveget, majd óvatosan nyomjuk össze a cseppentőt és cseppentsünk ki 1 cseppet. Nyomjuk tovább, amíg 4 cseppet ki nem cseppentett. Végül csavarjuk vissza a fehér kupakot. Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA:** BIOCODEX 7, avenue Galliéni 94250 Gentilly, Franciaország. 2009. október 1.

A tájékoztatás egészségügyi szakembereknek készült!

BIOCODEX

A&D Pharma
marketing & sales
ADPH Kft.

OTIP_2016_01

OTIPAX®

fenazon, lidokain-hidroklorid

Fülcsepp
Antibiotikum nélkül

Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő fülcsepp.



- 🔹 Heveny középfülgyulladás kezelésére,
- 🔹 influenza okozta, vírusos dobhártya vagy középfülgyulladás kezelésére,
- 🔹 otobaro-trauma kezelésére,
- 🔹 ép dobhártya mellett 0 éves kortól alkalmazható!

BIOCODEX 

Fülcsepp
Antibiotikum nélkül

Egyedi formula

Kombinált együttes hatás

Lidokain
helyi fájdalomcsillapító

Fenazon
gyulladáscsökkentő

5

percen
belül^(*)

Enyhíti a fájdalmat

használat

5 perc


15 perc

30 perc


15

percen
belül^(*)


Csökkenti a vérbőség okozta dobhártya fájdalmat



Heveny középfülgyulladás:
vérbődobhártya



Normál
dobhártya




OTIPAX®

fenazon, lidokain-hidroklorid

Fülcsepp
Antibiotikum nélkül

HEVENY KÖZÉPFÜLGYULLADÁS

A 3 éves vagy annál kisebb gyermekek 75-80%-át érinti*



- erős fájdalom
- a **középfül** gyulladása
- ± fülzúgás
- ± halláscsökkenés
- ± láz

Bakteriális, vírusos eredetű
és légnyomásváltozás okozta
fülgyulladás**

A heveny középfülgyulladásra (AOM) az Otipax® lehet a megoldás, (a fülkürt működésének biztosítása mellett) - bármi is annak a kiváltó oka.

A fülcsepp + orrcsepp együtt hat.

*Vergison A. & al . Otitis media and its consequence: beyond the earache. The lancet journal; March 2010; Vol 10:195-203.

**Bluestone C., Klein J. Otitis media in infants and children, Bc Decker Inc, Chapter 8, 2007.